

ร่าง

ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง

เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอางที่มีวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการเครื่องสำอาง ในการประชุมครั้งที่ ../... เมื่อวันที่
คณะกรรมการเครื่องสำอางออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในลำดับ 23 – 40 ลำดับ 44 และลำดับ 52 ของบัญชีแนบท้ายประกาศ
คณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอางที่มีวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสม
ในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ลำดับ	ชื่อวัตถุที่ใช้			บริเวณที่ใช้ และ/หรือ การนำไปใช้	คำเตือนที่ฉลาก
	Chemical Name/ Other Name	Name of Common Ingredients Glossary	CAS Number		
23	Ammonium monofluoro- phosphate	Ammonium monofluoro- phosphate	20859-38-5/ 66115-19-3	ยาสีฟัน	- เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีควรใช้ยาสีฟัน ปริมาณขนาดและขนแปรงพอเปียก หรือเท่าเมล็ดข้าวสาร เด็กอายุ 3 – ต่ำกว่า 6 ปี ควรใช้ยาสีฟัน ปริมาณเท่าเมล็ดข้าวโพดหรือ เมล็ดถั่วลิสง และผู้ใหญ่ใหญ่ดูแล ขณะแปรงฟัน ในกรณีของเด็ก ได้รับสารฟลูออไรด์ จากแหล่ง อื่นด้วย ให้ปรึกษาแพทย์ หรือ ทันตแพทย์ - มีสาร Ammonium monofluorophosphate

ลำดับ	ชื่อวัตถุดิบที่ใช้			บริเวณที่ใช้ และ/หรือ การนำไปใช้	คำเตือนที่ฉลาก
	Chemical Name/ Other Name	Name of Common Ingredients Glossary	CAS Number		
24	Disodium fluoro- phosphate	Sodium monofluoro- phosphate	10163-15-2/ 7631-97-2	น้ำยาบ้วนปาก	- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ในกรณีที่เด็กได้รับสารฟลูออไรด์ จากแหล่งอื่นด้วย ให้ปรึกษา แพทย์หรือทันตแพทย์ - มีสาร Ammonium monofluorophosphate
				ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในช่องปาก	มีสาร Ammonium monofluorophosphate
				ยาสีฟัน	- เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีควรใช้ยาสีฟัน ปริมาณขนาดและขนแปรงพอเปียก หรือเท่าเมล็ดข้าวสาร เด็กอายุ 3 – ต่ำกว่า 6 ปี ควรใช้ยาสีฟัน ปริมาณเท่าเมล็ดข้าวโพดหรือ เมล็ดถั่วลิสง และผู้ใหญ่ใหญ่ดูแล ขณะแปรงฟัน ในกรณีที่เด็ก ได้รับสารฟลูออไรด์ จากแหล่ง อื่นด้วย ให้ปรึกษาแพทย์ หรือ ทันตแพทย์ - มีสาร Sodium monofluorophosphate
				น้ำยาบ้วนปาก	- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ในกรณีที่เด็กได้รับสารฟลูออไรด์ จากแหล่งอื่นด้วย ให้ปรึกษา แพทย์หรือทันตแพทย์ - มีสาร Sodium Monofluorophosphate
				ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในช่องปาก	มีสาร Sodium monofluorophosphate

ลำดับ	ชื่อวัตถุที่ใช้			บริเวณที่ใช้ และ/หรือ การนำไปใช้	คำเตือนที่ฉลาก
	Chemical Name/ Other Name	Name of Common Ingredients Glossary	CAS Number		
25	Dipotassium fluoro- phosphate	Potassium monofluoro- phosphate	14104-28-0	ยาสีฟัน	- เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีควรใช้ยาสีฟัน ปริมาณขนาดและชนแปรงพอเปียก หรือเท่าเมล็ดข้าวสาร เด็กอายุ 3 – ต่ำกว่า 6 ปี ควรใช้ยาสีฟัน ปริมาณเท่าเมล็ดข้าวโพดหรือ เมล็ดถั่วลันเตา และมีผู้ใหญ่ดูแล ขณะแปรงฟัน ในกรณีของเด็ก ได้รับสารฟลูออไรด์ จากแหล่ง อื่นด้วย ให้ปรึกษาแพทย์ หรือ ทันตแพทย์ - มีสาร Potassium monofluorophosphate
				น้ำยาบ้วนปาก	- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ในกรณีเด็กได้รับสารฟลูออไรด์ จากแหล่งอื่นด้วย ให้ปรึกษา แพทย์หรือทันตแพทย์ - มีสาร Potassium monofluorophosphate
				ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในช่องปาก	มีสาร Potassium monofluorophosphate
26	Calcium fluoro- phosphate	Calcium monofluoro- phosphate	7789-74-4	ยาสีฟัน	- เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีควรใช้ยาสีฟัน ปริมาณขนาดและชนแปรงพอเปียก หรือเท่าเมล็ดข้าวสาร เด็กอายุ 3 – ต่ำกว่า 6 ปี ควรใช้ยาสีฟัน ปริมาณเท่าเมล็ดข้าวโพดหรือเมล็ด ถั่วลันเตา และมีผู้ใหญ่ดูแลขณะ แปรงฟัน ในกรณีเด็กได้รับสาร ฟลูออไรด์ จากแหล่งอื่นด้วย ให้ ปรึกษาแพทย์ หรือทันตแพทย์

ลำดับ	ชื่อวัตถุที่ใช้			บริเวณที่ใช้ และ/หรือ การนำไปใช้	คำเตือนที่ฉลาก
	Chemical Name/ Other Name	Name of Common Ingredients Glossary	CAS Number		
					- มีสาร Calcium monofluorophosphate
				น้ำยาบ้วนปาก	- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ในกรณีที่เด็กได้รับสารฟลูออไรด์ จากแหล่งอื่นด้วย ให้ปรึกษา แพทย์หรือทันตแพทย์ - มีสาร Calcium monofluorophosphate
				ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในช่องปาก	มีสาร Calcium monofluorophosphate
27	Calcium fluoride	Calcium fluoride	7789-75-5	ยาสีฟัน	- เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีควรใช้ยาสีฟัน ปริมาณขนาดและขนแปรงพอเปียก หรือเท่าเมล็ดข้าวสาร เด็กอายุ 3 – ต่ำกว่า 6 ปี ควรใช้ยาสีฟัน ปริมาณเท่าเมล็ดข้าวโพดหรือ เมล็ดถั่วลิสง และผู้มีผู้ใหญ่ดูแล ขณะแปรงฟัน ในกรณีที่เด็ก ได้รับสารฟลูออไรด์ จากแหล่ง อื่นด้วย ให้ปรึกษาแพทย์ หรือ ทันตแพทย์ - มีสาร Calcium fluoride
				น้ำยาบ้วนปาก	- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ในกรณีที่เด็กได้รับสารฟลูออไรด์ จากแหล่งอื่นด้วย ให้ปรึกษา แพทย์หรือทันตแพทย์ - มีสาร Calcium fluoride
				ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในช่องปาก	มีสาร Calcium fluoride

ลำดับ	ชื่อวัตถุที่ใช้			บริเวณที่ใช้ และ/หรือ การนำไปใช้	คำเตือนที่ฉลาก
	Chemical Name/ Other Name	Name of Common Ingredients Glossary	CAS Number		
28	Sodium fluoride	Sodium fluoride	7681-49-4	ยาสีฟัน	- เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีควรใช้ยาสีฟัน ปริมาณขนาดแต่ละขนแปรงพอเปียก หรือเท่าเมล็ดข้าวสาร เด็กอายุ 3 – ต่ำกว่า 6 ปี ควรใช้ยาสีฟัน ปริมาณเท่าเมล็ดข้าวโพดหรือเมล็ด ถั่วลันเตา และมีผู้ใหญ่ดูแลขณะ แปรงฟัน ในกรณีที่เด็กได้รับสาร ฟลูออไรด์ จากแหล่งอื่นด้วย ให้ ปรึกษาแพทย์ หรือทันตแพทย์ - มีสาร Sodium fluoride
				น้ำยาบ้วนปาก	- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ในกรณีที่เด็กได้รับสารฟลูออไรด์ จากแหล่งอื่นด้วย ให้ปรึกษา แพทย์หรือทันตแพทย์ - มีสาร Sodium fluoride
				ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในช่องปาก	มีสาร Sodium fluoride
29	Potassium fluoride	Potassium fluoride	7789-23-3	ยาสีฟัน	- เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีควรใช้ยาสีฟัน ปริมาณขนาดแต่ละขนแปรงพอเปียก หรือเท่าเมล็ดข้าวสาร เด็กอายุ 3 – ต่ำกว่า 6 ปี ควรใช้ยาสีฟัน ปริมาณเท่าเมล็ดข้าวโพดหรือ เมล็ดถั่วลันเตา และมีผู้ใหญ่ดูแล ขณะแปรงฟัน ในกรณีที่เด็ก ได้รับสารฟลูออไรด์ จากแหล่ง อื่นด้วย ให้ปรึกษาแพทย์ หรือ ทันตแพทย์ - มีสาร Potassium fluoride
				น้ำยาบ้วนปาก	- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ในกรณีที่เด็กได้รับสารฟลูออไรด์

ลำดับ	ชื่อวัตถุที่ใช้			บริเวณที่ใช้ และ/หรือ การนำไปใช้	คำเตือนที่ฉลาก
	Chemical Name/ Other Name	Name of Common Ingredients Glossary	CAS Number		
					จากแหล่งอื่นด้วย ให้ปรึกษาแพทย์หรือทันตแพทย์ - มีสาร Potassium fluoride
				ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในช่องปาก	มีสาร Potassium fluoride
30	Ammonium fluoride	Ammonium fluoride	12125-01-8	ยาสีฟัน	- เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีควรใช้ยาสีฟัน ปริมาณขนาดและขนแปรงพอเปียก หรือเท่าเมล็ดข้าวสาร เด็กอายุ 3 – ต่ำกว่า 6 ปี ควรใช้ยาสีฟัน ปริมาณเท่าเมล็ดข้าวโพดหรือ เมล็ดถั่วลิสง และผู้มีผู้ใหญ่ดูแล ขณะแปรงฟัน ในกรณีที่เด็ก ได้รับสารฟลูออไรด์ จากแหล่ง อื่นด้วย ให้ปรึกษาแพทย์ หรือ ทันตแพทย์ - มีสาร Ammonium fluoride
				น้ำยาบ้วนปาก	- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ในกรณีที่เด็กได้รับสารฟลูออไรด์ จากแหล่งอื่นด้วย ให้ปรึกษา แพทย์หรือทันตแพทย์ - มีสาร Ammonium fluoride
				ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในช่องปาก	มีสาร Ammonium fluoride
31	Aluminium fluoride	Aluminium fluoride	7784-18-1	ยาสีฟัน	- เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีควรใช้ยาสีฟัน ปริมาณขนาดและขนแปรงพอเปียก หรือเท่าเมล็ดข้าวสาร เด็กอายุ 3 – ต่ำกว่า 6 ปี ควรใช้ยาสีฟัน ปริมาณเท่าเมล็ดข้าวโพดหรือ เมล็ดถั่วลิสง และผู้มีผู้ใหญ่ดูแล

ลำดับ	ชื่อวัตถุที่ใช้			บริเวณที่ใช้ และ/หรือ การนำไปใช้	คำเตือนที่ฉลาก
	Chemical Name/ Other Name	Name of Common Ingredients Glossary	CAS Number		
					<p>ขณะแปรงฟัน ในกรณีของเด็ก ได้รับสารฟลูออไรด์ จากแหล่ง อื่นด้วย ให้ปรึกษาแพทย์ หรือ ทันตแพทย์</p> <p>- มีสาร Aluminium fluoride</p>
				น้ำยาบ้วนปาก	<p>- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ในกรณีเด็กได้รับสารฟลูออไรด์ จากแหล่งอื่นด้วย ให้ปรึกษา แพทย์หรือทันตแพทย์</p> <p>- มีสาร Aluminium fluoride</p>
				ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในช่องปาก	<p>มีสาร Aluminium fluoride</p>
32	Tin difluoride	Stannous fluoride	7783-47-3	ยาสีฟัน	<p>- เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีควรใช้ยาสีฟัน ปริมาณขนาดและขนแปรงพอเปียก หรือเท่าเมล็ดข้าวสาร เด็กอายุ 3 – ต่ำกว่า 6 ปี ควรใช้ยาสีฟัน ปริมาณเท่าเมล็ดข้าวโพดหรือ เมล็ดถั่วลิสง และผู้ใหญ่ดูแล ขณะแปรงฟัน ในกรณีเด็ก ได้รับสารฟลูออไรด์ จากแหล่ง อื่นด้วย ให้ปรึกษาแพทย์ หรือ ทันตแพทย์</p> <p>- มีสาร Stannous fluoride</p>
				น้ำยาบ้วนปาก	<p>- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ในกรณีเด็กได้รับสารฟลูออไรด์ จากแหล่งอื่นด้วย ให้ปรึกษา แพทย์หรือทันตแพทย์</p> <p>- มีสาร Stannous fluoride</p>
				ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในช่องปาก	<p>มีสาร Stannous fluoride</p>

ลำดับ	ชื่อวัตถุที่ใช้			บริเวณที่ใช้ และ/หรือ การนำไปใช้	คำเตือนที่ฉลาก
	Chemical Name/ Other Name	Name of Common Ingredients Glossary	CAS Number		
33	Hexadecyl ammonium- fluoride	Cetylamine hydrofluoride		ยาสีฟัน	- เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีควรใช้ยาสีฟัน ปริมาณขนาดและขนแปรงพอเปียก หรือเท่าเมล็ดข้าวสาร เด็กอายุ 3 – ต่ำกว่า 6 ปี ควรใช้ยาสีฟัน ปริมาณเท่าเมล็ดข้าวโพดหรือเมล็ด ถั่วลันเตา และมีผู้ใหญ่ดูแลขณะ แปรงฟัน ในกรณี que เด็กได้รับสาร ฟลูออไรด์ จากแหล่งอื่นด้วย ให้ ปรึกษาแพทย์ หรือทันตแพทย์ - มีสาร Cetylamine hydrofluoride
				น้ำยาบ้วนปาก	- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ในกรณี que เด็กได้รับสารฟลูออไรด์ จากแหล่งอื่นด้วย ให้ปรึกษา แพทย์หรือทันตแพทย์ - มีสาร Cetylamine hydrofluoride
				ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในช่องปาก	มีสาร Cetyl hydrofluoride
34	3-(N-Hexa- decyl-N-2- hydroxyethyl -ammonio) propylbis (2-hydroxy- ethyl) ammonium difluoride	Olafur	6818-37-7	ยาสีฟัน	- เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีควรใช้ยาสีฟัน ปริมาณขนาดและขนแปรงพอเปียก หรือเท่าเมล็ดข้าวสาร เด็กอายุ 3 – ต่ำกว่า 6 ปี ควรใช้ยาสีฟัน ปริมาณเท่าเมล็ดข้าวโพดหรือเมล็ด ถั่วลันเตา และมีผู้ใหญ่ดูแลขณะ แปรงฟัน ในกรณี que เด็กได้รับสาร ฟลูออไรด์ จากแหล่งอื่นด้วย ให้ ปรึกษาแพทย์ หรือทันตแพทย์ - มีสาร Olafur

ลำดับ	ชื่อวัตถุที่ใช้			บริเวณที่ใช้ และ/หรือ การนำไปใช้	คำเตือนที่ฉลาก
	Chemical Name/ Other Name	Name of Common Ingredients Glossary	CAS Number		
				น้ำยาบ้วนปาก	- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ในกรณีที่เด็กได้รับสารฟลูออไรด์ จากแหล่งอื่นด้วย ให้ปรึกษา แพทย์หรือทันตแพทย์ - มีสาร Olafur
				ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในช่องปาก	มีสาร Olafur
35	N,N',N'-Tris (polyoxy- ethylene)-N- hexadecyl- propylene- diamine dihydro- fluoride	-	-	ยาสีฟัน	- เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีควรใช้ยาสีฟัน ปริมาณขนาดตะขอนแปรงพอเปียก หรือเท่าเมล็ดข้าวสาร เด็กอายุ 3 – ต่ำกว่า 6 ปี ควรใช้ยาสีฟัน ปริมาณเท่าเมล็ดข้าวโพดหรือ เมล็ดถั่วลิสง และผู้มีผู้ใหญ่ดูแล ขณะแปรงฟัน ในกรณีที่เด็ก ได้รับสารฟลูออไรด์ จากแหล่ง อื่นด้วย ให้ปรึกษาแพทย์ หรือ ทันตแพทย์ - มีสาร N,N',N'-Tris(polyoxy- ethylene)-N-hexadecyl- propylenediamine dihydrofluoride
				น้ำยาบ้วนปาก	- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ในกรณีที่เด็กได้รับสารฟลูออไรด์ จากแหล่งอื่นด้วย ให้ปรึกษา แพทย์หรือทันตแพทย์ - มีสาร N,N',N'-Tris(polyoxy- ethylene)-N-hexadecyl- propylenediamine dihydrofluoride

ลำดับ	ชื่อวัตถุที่ใช้			บริเวณที่ใช้ และ/หรือ การนำไปใช้	คำเตือนที่ฉลาก
	Chemical Name/ Other Name	Name of Common Ingredients Glossary	CAS Number		
				ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในช่องปาก	มีสาร N,N',N'-Tris(polyoxy-ethylene)-N-hexadecyl-propylenediamine dihydrofluoride
36	9-Octadecen-1-amine hydrofluoride	Octadecenyl ammonium fluoride	36505-83-6/ 2782-81-2	ยาสีฟัน	- เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีควรใช้ยาสีฟัน ปริมาณขนาดและขนาดแปรงพอเปียก หรือแท่งแปรงสีฟันสำหรับเด็ก อายุ 3 – ต่ำกว่า 6 ปี ควรใช้ยาสีฟัน ปริมาณเท่าเม็ดข้าวโพดหรือ เม็ดถั่วลิสง และผู้ใหญ่ใหญ่ดูแล ขณะแปรงฟัน ในกรณีที่เด็ก ได้รับสารฟลูออไรด์ จากแหล่ง อื่นด้วย ให้ปรึกษาแพทย์ หรือ ทันตแพทย์ - มีสาร Octadecenyl-ammonium fluoride
				น้ำยาบ้วนปาก	- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ในกรณีที่เด็กได้รับสารฟลูออไรด์ จากแหล่งอื่นด้วย ให้ปรึกษา แพทย์หรือทันตแพทย์ - มีสาร Octadecenyl-ammonium fluoride
				ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในช่องปาก	มีสาร Octadecenyl-ammonium fluoride
37	Disodium hexafluoro-silicate	Sodium fluorosilicate	16893-85-9	ยาสีฟัน	- เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีควรใช้ยาสีฟัน ปริมาณขนาดและขนาดแปรงพอเปียก หรือแท่งแปรงสีฟันสำหรับเด็ก อายุ 3 – ต่ำกว่า 6 ปี ควรใช้ยาสีฟัน ปริมาณเท่าเม็ดข้าวโพดหรือ เม็ดถั่วลิสง และผู้ใหญ่ใหญ่ดูแล

ลำดับ	ชื่อวัตถุที่ใช้			บริเวณที่ใช้ และ/หรือ การนำไปใช้	คำเตือนที่ฉลาก
	Chemical Name/ Other Name	Name of Common Ingredients Glossary	CAS Number		
					<p>ขณะแปรงฟัน ในกรณีที่เด็กได้รับสารฟลูออไรด์ จากแหล่งอื่นด้วย ให้ปรึกษาแพทย์ หรือทันตแพทย์</p> <p>- มีสาร Sodium fluorosilicate</p>
				น้ำยาบ้วนปาก	<p>- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ในกรณีที่เด็กได้รับสารฟลูออไรด์ จากแหล่งอื่นด้วย ให้ปรึกษาแพทย์หรือทันตแพทย์</p> <p>- มีสาร Sodium fluorosilicate</p>
				ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในช่องปาก	มีสาร Sodium fluorosilicate
38	Dipotassium hexafluoro-silicate	Potassium fluorosilicate	16871-90-2	ยาสีฟัน	<p>- เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีควรใช้ยาสีฟัน ปริมาณขนาดตะขบแปรงพอเปียก หรือเท่าเมล็ดข้าวสาร เด็กอายุ 3 – ต่ำกว่า 6 ปี ควรใช้ยาสีฟัน ปริมาณเท่าเมล็ดข้าวโพดหรือเมล็ดถั่วลิสง และผู้ใหญ่ใหญ่ดูแล</p> <p>ขณะแปรงฟัน ในกรณีที่เด็กได้รับสารฟลูออไรด์ จากแหล่งอื่นด้วย ให้ปรึกษาแพทย์ หรือทันตแพทย์</p> <p>- มีสาร Potassium fluorosilicate</p>
				น้ำยาบ้วนปาก	<p>- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ในกรณีที่เด็กได้รับสารฟลูออไรด์ จากแหล่งอื่นด้วย ให้ปรึกษาแพทย์หรือทันตแพทย์</p> <p>- มีสาร Potassium fluorosilicate</p>

ลำดับ	ชื่อวัตถุที่ใช้			บริเวณที่ใช้ และ/หรือ การนำไปใช้	คำเตือนที่ฉลาก
	Chemical Name/ Other Name	Name of Common Ingredients Glossary	CAS Number		
				ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในช่องปาก	มีสาร Potassium fluorosilicate
39	Ammonium hexafluoro- silicate	Ammonium fluorosilicate	16919-19-0	ยาสีฟัน	- เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีควรใช้ยาสีฟัน ปริมาณขนาดและขนแปรงพอเปียก หรือเท่าเมล็ดข้าวสาร เด็กอายุ 3 – ต่ำกว่า 6 ปี ควรใช้ยาสีฟัน ปริมาณเท่าเมล็ดข้าวโพดหรือ เมล็ดถั่วลิสง และผู้ใหญ่ควรดูแล ขณะแปรงฟัน ในกรณีที่เด็ก ได้รับสารฟลูออไรด์ จากแหล่ง อื่นด้วย ให้ปรึกษาแพทย์ หรือ ทันตแพทย์ - มีสาร Ammonium fluorosilicate
				น้ำยาบ้วนปาก	- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ในกรณีที่เด็กได้รับสารฟลูออไรด์ จากแหล่งอื่นด้วย ให้ปรึกษา แพทย์หรือทันตแพทย์ - มีสาร Ammonium fluorosilicate
				ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในช่องปาก	มีสาร Ammonium fluorosilicate
40	Magnesium hexafluoro- silicate	Magnesium fluorosilicate	16949-65-8	ยาสีฟัน	- เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีควรใช้ยาสีฟัน ปริมาณขนาดและขนแปรงพอเปียก หรือเท่าเมล็ดข้าวสาร เด็กอายุ 3 – ต่ำกว่า 6 ปี ควรใช้ยาสีฟัน ปริมาณเท่าเมล็ดข้าวโพดหรือ เมล็ดถั่วลิสง และผู้ใหญ่ควรดูแล ขณะแปรงฟัน ในกรณีที่เด็ก ได้รับสารฟลูออไรด์ จากแหล่ง

ลำดับ	ชื่อวัตถุที่ใช้			บริเวณที่ใช้ และ/หรือ การนำไปใช้	คำเตือนที่ฉลาก
	Chemical Name/ Other Name	Name of Common Ingredients Glossary	CAS Number		
					อื่นด้วย ให้ปรึกษาแพทย์ หรือ ทันตแพทย์ - มีสาร Magnesium fluorosilicate
				น้ำยาบ้วนปาก	- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ในกรณีที่เด็กได้รับสารฟลูออไรด์ จากแหล่งอื่นด้วย ให้ปรึกษา แพทย์หรือทันตแพทย์ - มีสาร Magnesium fluorosilicate
				ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในช่องปาก	มีสาร Magnesium fluorosilicate
44	3-Pyridine- methanol hydrofluoride	Nicomethanol hydrofluoride	62756-44-9	ยาสีฟัน	- เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีควรใช้ยาสีฟัน ปริมาณขนาดและขนแปรงพอเปียก หรือเท่าเมล็ดข้าวสาร เด็กอายุ 3 – ต่ำกว่า 6 ปี ควรใช้ยาสีฟัน ปริมาณเท่าเมล็ดข้าวโพดหรือ เมล็ดถั่วลิสง และผู้ใหญ่ผู้ดูแล ขณะแปรงฟัน ในกรณีที่เด็ก ได้รับสารฟลูออไรด์ จากแหล่ง อื่นด้วย ให้ปรึกษาแพทย์ หรือ ทันตแพทย์ - มีสาร Nicomethanol hydrofluoride
				น้ำยาบ้วนปาก	- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ในกรณีที่เด็กได้รับสารฟลูออไรด์ จากแหล่งอื่นด้วย ให้ปรึกษา แพทย์หรือทันตแพทย์ - มีสาร Nicomethanol hydrofluoride

ลำดับ	ชื่อวัตถุที่ใช้			บริเวณที่ใช้ และ/หรือ การนำไปใช้	คำเตือนที่ฉลาก
	Chemical Name/ Other Name	Name of Common Ingredients Glossary	CAS Number		
				ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในช่องปาก	มีสาร Nicomethanol hydrofluoride
52	Magnesium fluoride	Magnesium fluoride	7783-40-6	ยาสีฟัน	- เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ควรใช้ยาสีฟัน ปริมาณขนาดและขนแปรงพอเปียก หรือเท่าเมล็ดข้าวสาร เด็กอายุ 3 – ต่ำกว่า 6 ปี ควรใช้ ยาสีฟันปริมาณเท่าเมล็ดข้าวโพด หรือเมล็ดถั่วลิสง และมีผู้ใหญ่ดูแลขณะแปรงฟัน - ในกรณี que เด็กได้รับสารฟลูออไรด์ จากแหล่งอื่นด้วย ให้ปรึกษา แพทย์ หรือทันตแพทย์ - มีสาร Magnesium fluoride
				น้ำยาบ้วนปาก	- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ในกรณี que เด็กได้รับสารฟลูออไรด์ จากแหล่งอื่นด้วย ให้ปรึกษา แพทย์หรือทันตแพทย์ - มีสาร Magnesium fluoride
				ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในช่องปาก	มีสาร Magnesium fluoride”

ข้อ ๒ สารลำดับ 23 – 40 ลำดับ 44 และลำดับ 52 ตามประกาศฉบับนี้ ให้ผู้ผลิตเพื่อขาย
ผู้นำเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง
ที่มีการจัดทำฉลากอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในหนึ่งปี นับแต่
วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่

(นายมนเทียร คณาสวัสดิ์)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ
ประธานคณะกรรมการเครื่องสำอาง